NUTRIFARM
Specialist in Vegetable Nutrition

EMPRESAS IANSA
INSUMOS AGRICOLAS

Fosfito 40-20

Fosfito de Potasio 40-20
Biopotenciado con Algas Marinas

NUTRIFARM **Fosfito 40-20 Plus** es un biestimulante líquido en base a Fosfito de Potasio, esto lo hace ser un inductor de resistencia adquirida (SAR), lo que permite aumentar la resistencia a todo tipo de estrés, además posee actividad sobre el crecimiento de raíces. Actúa estimulando el metabolismo de la planta y equilibra sus funciones fisiológicas a nivel de células, desarrollando su potencial productivo frente al estrés climático y biótico (Hongos) que pueda presentar la planta.

•Estimula Lignificación y crecimiento de raíces.
•Almacenamiento y transferencia de Energía.
•Amplio espectro de acción.
•Actúa como promotor de las defensas de las plantas y mejora la resistencia a enfermedades.
•Contiene 15 % de extracto de algas marinas.
•Acción sistémica.
•Se puede usar vía foliar.
•Prolongado efecto.
Excelentes resultados a bajas dosis.

Preparación de la Mezcla:

NUTRIFARM **Fosfito 40-20 Plus** se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador a medio llenar de agua y completar a volumen total con agitación.

Carencia:

NUTRIFARM **Fosfito 40-20 Plus** es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso del producto fitosanitario, con el cual sea mezclado este bioestimulante.

Composición Mínima:

Fósforo (P2O5)	40 %	p/v
Potasio (K2O)	20 %	p/v
Extracto de Algas Marinas, Aminoácidos	15 %	p/v

Uso y Recomendaciones

Cultivo	*Dosis Litros/ha cc/litro agua*	*N° de aplicaciones*	*Momento de aplicación*
Naranjos, Limonesros, Pomelos, mandarinos, Olivos, Paltos	2-4 L/ha 400-500 cc/100 L agua	Cada 10-12 Días	Durante los períodos de activo creciemiento radicular, en primavera-verano y verano-otoño. Cuando las condiciones de humedad sean favorables para el desarrollo de enfermedades.
Vid de mesa, Vid vinífera, Vid pisquera	2-4 L/ha 400-500 cc/100 L agua	Cada 10-12 Días	Durante los peíodos de activo crecimiento radicular, en primavera-verano y verano-otoño.
Árandanos, Frutillas, Moras, Frambuesas	2-4 L/ha 400-500 cc/100 L agua	Cada 10-12 Días	Durante los peíodos de activo crecimiento radicular, en primavera-verano y verano-otoño.
Duraznos, Almendro, Damasco, Avellano, Cerezos ,Kiwi	4-5 L/ha 500-600 cc/100 L agua	Cada 10-12 Días	Durante los peíodos de activo crecimiento radicular, en primavera-verano y verano-otoño.
Perales y Manzanos	4-5 L/ha 500-600 cc/100 L agua	Cada 10-12 Días	Durante los peíodos de activo crecimiento radicular, en primavera-verano y verano-otoño.
Melones, Sandías, Pepinos, Zapallos, Zapallo Guarda.	1-2 L/ha 350-400 cc/100 L agua	Cada 10-12 Días	Desde tres a cuatro hojas verdaderas.
Tomates, Ají, Pimientos	1-2 L/ha 350-400 cc/100 L agua	Cada 10-12 Días	Desde 3° - 4ª hoja verdadera hasta cosecha.
Maíz Grano y Semillero	2-3 L/ha 400 cc/100 L agua	Cada 10-12 Días	Desde 4ª hoja verdadera hasta 6° hoja verdadera
Soya, Canola	4-5 L/ha 500-600 cc/100 L agua	2 -3	Desde 4ª hoja verdadera.
Trigo, arroz, Cebada, Avena	2-3 L/ha 400 cc/100 L agua	Cada 10-12 Días	1ª desde 4ª hoja verdadera 2ª Macollamiento 3ª Encañado
Brócoli, Coliflor, Ajo, Cebolla, Puerro, Cebollín, Repollo	3-5 L/ha 400-500 cc/100 L agua	3 aplicaciones cada 10 días	Desde 7 a 10 días post trasplante.
Papa, Camote	3-5 L/ha 400-500 cc/100 L agua	Cada 10-12 Días	Desde 4ª hoja hasta 20 días antes de cosecha.
Arverjas y Habas	1 L/ha	1 - 2	Primeras flores junto **Nutrifarm Zinc**, **Boro** y **Potasio Plus**.