NUTRIFARM
Specialist in Vegetable Nutrition

EMPRESAS IANSA
INSUMOS AGRICOLAS

Hierro Plus

Quelato de Aminoácido de Hierro Biopotenciado con Algas Marinas

NUTRIFARM **Hierro Plus** ha sido desarrollado bajo estrictas normas de calidad y bajo un proceso productivo de punta. Para una utilización y absorción optima, los minerales en este producto son combinados con compuestos orgánicos naturales.
El complemento orgánico es derivado de un proceso exclusivo el cual permite la quelatación del elemento.

Preparación de la Mezcla:

NUTRIFARM **Hierro Plus** se debe llenar el estanque del aspersor con agua hasta la mitad, agregar la dosis correcta del producto.
Agitar y completar el volumen de agua. Para resultados óptimos aplicar en horas tempranas de la mañana ó en las últimas horas de la tarde.

Carencia:

NUTRIFARM **Hierro Plus** en dosis recomendadas es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso del producto fitosanitario, con el cual sea mezclado este bioestimulante.

Composición Mínima:

Hierro(Fe)	5 %	p/v
Extracto de Alga Marinas	50 %	p/v

Uso y Recomendaciones

Cultivo	*Dosis Litros/ha cc/litro agua*	*Nº de aplicaciones*	*Momento de aplicación*
Naranjos, Limonesros, Pomelos, mandarinos, Olivos, Paltos	1-3 L/ha	2 - 3	Inicio de formación de frutos y post cosecha.
Vid de mesa, Vid vinífera, Vid pisquera	1-3 L/ha	2 - 3	Con brote de 20 - 50 cm. y en post cuaja.
Árandanos, Frutillas, Moras, Frambuesas	1-3 L/ha	1- 2	Inicio formación de frutos.
Almendro, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Nectarines, Nogales.	1-3 L/ha	1- 2	Inicio formación de frutos.
Perales y Manzanos	1-3 L/ha	1- 2	Inicio formación de frutos.
Kiwi	1-3 L/ha	1- 3	Con brote de 40 - 60 cm. e inicio formación de frutos.
Melones, Sandías, Pepinos, Zapallos	1-2 L/ha 300 - 350 cc/100 L de agua	1- 2	Inicio formación de frutos.
Tomates, Ají, Pimientos, Repollo, Brócoli, Coliflor	1-2 L/ha 300 - 350 cc/100 L de agua	1- 2	Inicio formación de frutos.
Maíz grano y Semillero	1-2 L/ha 300 - 350 cc/100 L de agua	1- 2	Polinización y/o llenado de grano.
Arroz, Trigo , Cebada.	1-2 L/ha 300 - 350 cc/100 L de agua	1- 2	Polinización y/o llenado de grano.
Ajo, Cebolla, Puerro, Cebollín	1-2 L/ha 300 - 350 cc/100 L de agua	1- 2	Inicio bulbificación.
Papa, Camote	1-2 L/ha 300 - 350 cc/100 L de agua	1- 2	En Floración y/o caída de flor.